

mRNA (BNT162b2) COVID-19 AŐI UYGULAMASI BİLGİLENDİRME ve ONAM FORMU

Covid-19 aŐıları hem size hem de çevrenizdekileri hastalanmadan bir antikor yanıtı oluşturarak korur.

Covid-19 aŐıları, klinik çalıŐmalarda dikkatle deęerlendirilmiŐ aŐılardır.

AŐı uygulaması, 28 gn ara ile birer doz olmak zere toplam iki doz olarak yapılacaktır.

COVID-19 aŐısı uygulamasından sonra nadiren yorgunluk, baŐ ağrısı, ateŐ, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aŐı uygulanan blgede ağrı, kızarıklık, ŐiŐlik gibi hafif yan etkiler ile karŐılaŐılabilir. Çok nadir olarak da alerjik reaksiyon grlebileceęi bildirilmiŐtir.

Gebelik ve emzirme dneminde mRNA aŐısının uygulanmasına iliŐkin henz yeterli veri bulunmamaktadır.

Bu aŐının uzun sreli etkilerinin ve verimlilięinin Őu an bilinmedięi yine aŐının henz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceęi, rnn salgın koŐulları altında tamamen kiŐinin kendi istemesi halinde kiŐiye uygulanacaęı bilinmelidir. Bu sebeple retime ait hataların haricinde oluŐabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda retici firma sorumlu olmayacaęını beyan etmektedir.

AŐı uygulamasından sonra, alerjik reaksiyonunun takibi aŐısından; normal Őartlarda 15 dakika, alerji yks varsa 30 dakika sresince aŐı uygulanan kiŐinin saęlık tesisinden ayrılmaması nerilmektedir.

AŐı uygulamasından sonra aŐıyla iliŐkili olabileceęi dŐnlen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda size en yakın saęlık kuruluŐuna (Aile Saęlıęı Merkezi veya hastane) baŐvurunuz. Hekiminize yakın zamanda aŐı olduęunuz bilgisini iletmeyi unutmayınız.

AŐı uygulamasından sonra da maske, mesafe ve temizlik gibi nlemleri uygulamaya devam ediniz.

mRNA aŐı uygulamasıyla alakalı olarak yukarıda yazılanları okudum, anladım, tarafıma aŐı uygulanmasına onam veriyorum.

Ad Soyad:

T.C.:

Tarih:

İmza: